



BIOSAN GLUTAL

Detergente per allevamenti intensivi

CARATTERISTICHE

BIOSAN GLUTAL è un detergente concentrato da impiegarsi diluito in soluzioni acquose.

Trova principalmente impiego nel settore zootecnico per il trattamento degli ambienti destinati alla stabulazione degli animali.

Il pH delle sue soluzioni, alle concentrazioni d'uso, si stabilizza nel range 7,5-8,5 che è l'ottimale per l'azione dei tensioattivi e degli altri costituenti del formulato. Il tensioattivo utilizzato è del tipo a schiuma controllata e pertanto oltre a rimuovere lo sporco organico, favorisce l'impiego del prodotto con i sistemi di nebulizzazione ed inoltre permette un agevole risciacquo.

Le soluzioni di **BIOSAN GLUTAL** non aggrediscono le superfici ed i materiali comunemente presenti nelle strutture degli allevamenti.

La diluizione in acqua del prodotto è completa e veloce.

E' particolarmente raccomandato negli allevamenti intensivi di: galline, tacchini, conigli, suini, caprini, bovini e equini.

Ottimo anche nei canili e nelle cliniche veterinarie (stabulari, reparti contumaciali e sale per la monta).

DATI CHIMICO/FISICI

Stato fisico	: liquido
Colore	: blu
Densità _(20°C)	: 0,985 Kg/lt
Solubilità in acqua	: totale
pH _(t.q.)	: 3,5
pH _(sol. 1%)	: 7,5-8,0
Schiumosità _(sol.1%)	: 5ml (20°C)

MODALITA' D'USO

Il prodotto deve essere utilizzato solo dopo aver allontanato gli animali e dopo che l'operatore ha indossato i D.P.I. raccomandati nella scheda di sicurezza.

1ª fase: rimuovere la lettiera, i residui fecali, alimentari e tutto quanto costituisce lo sporco solido. Portare all'esterno l'eventuale assito o grigliato.

2ª fase: presgrassare con una soluzione



all'1% di **BIOSAN** al fine di sgrassare bene le pavimentazioni, le pareti e gli arredi presenti. Sottoporre allo stesso trattamento l'assito e il grigliato.

3ª fase: risciacquare con acqua di rete (di buona qualità igienica).

4ª fase: detergere con una soluzione acquosa di **BIOSAN GLUTAL** avente una concentrazione compresa nell'intervallo 0,5-2%.

5ª fase: avviare il nuovo ciclo di allevamento almeno dopo 2 ore dal trattamento.

Si consiglia di sottoporre allo stesso trattamento tutte le attrezzature utilizzate per la pulizia delle stalle, prestando particolare attenzione alle suole degli stivali usati dal personale addetto.